


# CALENDÁRIO NACIONAL DE VACINAÇÃO - GESTANTE



| Agendar<br>ao saber da<br>gravidez | VACINA               | DOSE                                                        | DOENÇAS EVITADAS                                                  |
|------------------------------------|----------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
|                                    | hepatite B           | 3 doses, conforme histórico vacinal                         | hepatite B, hepatite D                                            |
|                                    | dT                   | 3 doses, conforme histórico vacinal                         | difteria, tétano                                                  |
|                                    | influenza trivalente | 1 dose por temporada                                        | influenza ou gripe                                                |
|                                    | covid-19             | 1 dose a cada gestação                                      | formas graves da covid-19 e óbitos causados pelo vírus SARS-CoV-2 |
|                                    | dTpa                 | 1 dose a partir da 20ª semana gestacional, em cada gestação | difteria, tétano, coqueluche                                      |
|                                    | febre amarela*       | 1 dose, em casos excepcionais, conforme histórico vacinal   | febre amarela                                                     |
|                                    | SRV                  | 1 dose por gestação                                         | Vírus Sincicial Respiratório                                      |

\*Obs.: A vacina contra febre amarela pode ser recomendada para gestantes quando há alto risco de contrair a doença e não é possível adiar a vacinação. Isso vale para quem vive ou vai viajar para áreas com transmissão ativa, sempre após avaliação do serviço de saúde. Para viajantes, a vacina deve ser tomada pelo menos 10 dias antes da viagem.